

# Инфекции, передаваемые половым путём

Основные венерические болезни,  
их признаки и меры профилактики

# *Венерические заболевания*

- *Заболевания/инфекции/болезни, передающиеся половым путем (сокр. – ЗППП / ВППП / ИППП)*

# **Классификация ИПП**

- Венерические заболевания, или классические – сифилис, гонорея
- «Новые» венерические болезни (инфекции мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов) – генитальный герпес, трихомоноз, хламидиоз, уреаплазмоз
- Болезни кожи, передающиеся половым путём – чесотка, педикулез, лобковые вши
- Болезни, передаваемые половым путем, с преимущественным поражением других органов – ВИЧ, сибирские гепатиты В и С

# Сифилис

- Хроническое сенерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериози видом *Treponema pallidum* (бледная трепонема)

# **Стадии развития и симптомы**

- I. Инкубационный период** – от момента проникновения возбудителя в организм до появления твердого шанкра (3-4 недели, но может уменьшаться до 8-10 дней, или увеличиваться до 108-109 дней)
- II. Первичный период** – с момента появления твердого шанкра до возникновения на коже и слизистых специфической сыпи (6-7 недель с поражением близлежащих лимфатических узлов)
- III. Вторичный сифилис** – высыпания на коже («кощурелье Венеры»), поражение нервной системы, костей, печени, почек
- IV. Третичный сифилис** – поражение всех органов и систем организма

# Гонорея

- Венерическое инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком (гонококком), передаваемое половым путём и характеризующееся поражением слизистых оболочек мочеполовых органов

# **Симптомы болезни**

- Заболевание проявляется через 3-7 суток после заражения; протекает остро или хронически
- Острая гонорея характеризуется выделением слизи, гноя, ощущением щекотания, жжения и боли в терминальном отделе уретрального канала, частыми позывами к болезненному мочеиспусканию
- У 50% зараженных никаких симптомов в начале заболевания не наблюдается
- Наиболее склонны к мало-/бессимптомному течению заболевания **женщины**

# **Генитальный герпес**

- *Инфекция мочеполовых органов с преимущественным поражением половых органов, возбудителем которой является вирус простого герпеса (*Herpes simplex virus HSV*)*
- \* *Различают два вида вируса простого герпеса:*
- *HSV-1 - вызывает поражения полости рта*
- *HSV-2 - вызывает поражения половых органов*

# *Симптомы*

- *Обнаруживаются через 3-7 дней после контакта (полный цикл - до 3-х недель)*
- *Появляется воспаление, образуются пузырьки; пузырьки лопаются, возникают небольшие язвочки; формируется корочка; поверхность заживает в течение нескольких дней*
- *У мужчин герпетические поражения половых органов обычно развиваются на половом члене и внутренней поверхности крайней плоти*
- *Процесс часто сопровождается местными болями, лихорадкой, уплотнением паховых лимфатических узлов; обострение заболевания могут предшествовать покалывание или ощущение жжения*

# Хламидиоз

- Инфекционное заболевание, передающееся половым путём, вызываемое хламидиями (*Chlamydia trachomatis*)

# **Симптомы и стадии болезни**

- Инкубационный период - от 2-х недель до 1 месяца
- Часто протекает бессимптомно (с минимальными проявлениями); абсолютно без симптомов протекает у 46 % мужчин и 67 % женщин (если все симптомы присутствуют, то выражены они не ярко)

# *Симптомы у женщин*

- Неприятные по запаху слизистые или слизисто-гнойные (с желтоватым оттенком) выделения из влагалища
- Несильные боли в области наружных и внутренних половых органов, зуд и экссенция (в т.ч. - при мочеиспускании)
- Боли внизу живота (в области малого таза)
- Общая слабость и легкая температура (симптомы интоксикации)

# **Симптомы у мужчин**

- *Легкое воспаление мочеиспускательного канала – уретрит (не менее нескольких месяцев)*
- *Скудные стекловидные выделения из мочеиспускательного канала*
- *Зуд и жжение при мочеиспускании*
- *Несильные боли в мочеиспускательном канале, в мошонке, в пояснице, в яичках*
- *Повышение температуры (до 37°C)*
- *Общая слабость - следствие интоксикации*

# **Профилактика ИППП**

- **Воздергание от «случайных» связей** (нет гарантии, что даже самые «приличные» мужчины и женщины здоровы - ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение - ничто не может говорить о наличии/отсутствии у него венерических заболеваний)
- **Использование презерватива** (презерватив - классическое средство профилактики ИППП, однако его эффективность не 100%, поэтому перед использованием обязательно прочтите инструкцию)

*Спасибо за внимание!*